

# Metanfetaminas: Cuándo Debe Pedir Ayuda

## Muertes por Sobredosis de Metanfetaminas



Las muertes por metanfetaminas han  **aumentado 600%** en la última década en el estado de WA.

Para más información visite [stopoverdose.org](http://stopoverdose.org)



**¡Preste atención a estos signos y actúe!**

- Frecuencia cardiaca muy acelerada (2 a 3 veces más rápida de lo normal)
- Temperatura alta (sudando o piel caliente y seca)
- Dolor de cabeza muy intenso
- Dolor u opresión en el pecho
- Incapacidad para caminar o moverse
- Incapacidad para despertar
- Falta de sensibilidad en brazos o piernas
- Convulsiones o temblores incontrolables



**¡Llame al 911!**

Si observa alguno de estos signos, **¡llame al 911** o consiga atención médica de inmediato!

La **Ley del Buen Samaritano en Casos de Sobredosis**

los protege a usted y a la víctima de ser procesados por posesión de drogas.



**¿Quiere ayuda para reducir su consumo de metanfetaminas?**

Llame a la [Línea de Ayuda para la Recuperación de Washington](http://Linea de Ayuda para la Recuperación de Washington) al 1.866.789.1511



CENTER FOR COMMUNITY-ENGAGED  
DRUG EDUCATION, EPIDEMIOLOGY,  
AND RESEARCH

